

## Wenn der Schlaf gestört ist

Bei vielen Menschen mit Demenz ist im Verlaufe der Krankheit der Schlaf gestört. Betroffene schlafen schlecht ein, erwachen in der Nacht und werden aktiv. Eine Schlafstörung ist umso beschwerlicher, als sie auch die Erholung und somit das Wohlbefinden der Angehörigen in Mitleidenschaft zieht. Mit verschiedenen Massnahmen lässt sich der Schlaf von Demenzkranken jedoch verbessern. In schwereren Fällen bringen Angebote wie Tages- und Nachtstätten die nötige Entlastung.

Rund 40 Prozent der Menschen mit Demenz leiden zeitweise unter Schlafstörungen. Dies äussert sich beispielsweise darin, dass die erkrankte Person am Abend unruhig wird und nicht einschlafen kann. Oder dass sie zwar einschläft, dann aber mehrmals in der Nacht aufwacht. Es passiert auch häufig, dass die erkrankte Person in der Nacht eine lange Wachperiode erlebt, aufsteht, die Wohnung erkundet oder gar verlässt. Oder dass sie sehr früh erwacht und dann etwas erledigen möchte. Die Ursachen dafür können verschiedener Natur sein:

- Im Alter verändert sich der Schlaf auch bei gesunden Menschen: Er wird häufiger unterbrochen und der Tiefschlafanteil sinkt. Das macht sich beispielsweise dadurch bemerkbar, dass man in der Nacht häufiger aufwacht und weniger lang schläft.
- Bei Menschen mit Demenz hat ein Mangel an körperlicher Aktivität am Tag oft zur Folge, dass sie sich nachts weniger müde fühlen.
- Häufige und längere Nickerchen am Tag führen dazu, dass ein Grossteil des Schlafpensums bereits vor der Nacht erfüllt ist.
- Gegen Abend werden Menschen mit Demenz oft unruhiger und aktiver. Mit dem Einnachten nimmt ihre Desorientierung häufig zu. Dies erschwert das Zubettgehen.

– Durch die Demenz kann der Schlaf-Wach-Rhythmus also das, was man «innere Uhr» nennt – durcheinander geraten. Erkrankte haben Schwierigkeiten, Nacht und Tag auseinanderzuhalten.

– Zusätzliche körperliche und psychische Probleme können einen negativen Einfluss auf den Schlaf haben.

Die Schlafstörungen der erkrankten Person beeinträchtigen auch die Gesundheit des pflegenden Angehörigen, der sich nachts nicht mehr ausreichend erholen kann. Als Angehöriger schläft man selber unruhig, ist besorgt, steht auf um nachzuschauen und hat nachher vielleicht Mühe, wieder einzuschlafen. Viele Angehörige schlafen daher kaum mehr durch; sie leiden unter Schlafmangel und Erschöpfung.

Treten bei einem Menschen mit Demenz Schlafstörungen auf, ist es daher wichtig, nach den Ursachen zu suchen und Lösungen zu finden, mit denen nicht nur die erkrankte Person, sondern auch die pflegenden Angehörigen wieder mehr Ruhe finden.

## Mit Schlafstörungen umgehen: nützliche Hinweise

**Wie bei allen anderen Problemen lohnt es sich auch bei Schlafstörungen zu fragen, in welchem Zusammenhang sie auftreten und was der Grund dafür sein könnte. Erkennt man mögliche Ursachen, lässt sich mit entsprechenden Massnahmen oft eine Besserung bewirken. Im Folgenden werden ein paar typische schwierige Situationen beschrieben und mögliche Lösungsansätze aufgezeigt.**

### **Zunehmende Unruhe am Abend**

Bei Menschen mit Demenz nehmen am späten Nachmittag und Abend Unruhe, Verwirrtheit und Bewegungsdrang oft zu. Dies bezeichnet man auch als «Sundowning»-Phänomen. Als Ursache desselben wird ein Prozess vermutet, bei dem das Gehirn gegen Abend Stimulierungen nicht mehr so gut verarbeitet, was zu inneren Spannungen führt. Eine zusätzliche Erklärung ist auch, dass sich das bei Demenzkranken beeinträchtigte Wahrnehmungsvermögen in der Abenddämmerung aufgrund der Lichtverhältnisse weiter verschlechtert, was zunehmende Unsicherheit und Verwirrung auslöst. Das «Sundowning» kann bewirken, dass das Zubettgehen und Einschlafen für Menschen mit Demenz schwierig wird. Folgende Möglichkeiten bieten sich an, um der Unruhe am Abend entgegenzuwirken:

- Mit Aktivitäten und sozialen Kontakten lassen sich Menschen mit Demenz am Tag stimulieren und werden dann gegen Abend müde. (Siehe dazu auch das Infoblatt: «Den Alltag aktiv gestalten».)
- Viel Bewegung tagsüber sorgt für eine «gesunde Müdigkeit». Ein Spaziergang am Nachmittag versorgt die betroffene Person mit der notwendigen Dosis Tageslicht, was sich positiv auf den Schlafrhythmus auswirkt.
- Am Abend sollten die Reize gedämpft und Aufregung vermieden werden: Radio und Fernseher leiser stellen oder ganz ausschalten, etwas leiser sprechen. Dies hilft, eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Sanfte Musik wirkt beruhigend.

- Ein friedliches Abend- beziehungsweise Einschlafritual fördert die Schlafbereitschaft: Ein paar besinnliche Worte, ein Gedicht, ein gemeinsames Gebet oder das Erzählen einer schönen Erinnerung helfen beim Einschlafen.

### **Nächtliches Aufwachen**

Mit dem Fortschreiten der Krankheit kommt es vor, dass Betroffene in der Nacht wiederholt aufwachen. Aufgrund ihrer zeitlichen Desorientierung meinen sie, es sei Zeit zum Aufstehen und gehen in der Wohnung Tätigkeiten nach, die sie von früher her gewohnt sind. Dies führt zu längeren Unterbrüchen des Schlafes. Die Betroffenen haben vergessen, dass sie im Bett waren, wissen nicht mehr, wo sie sind und wollen gelegentlich «nach Hause» zurück. Kompensiert wird der fehlende Schlaf in der Nacht durch Schlafphasen am Tag.

In schweren Fällen verliert ein Mensch mit Demenz den für eine erwachsene Person normalen, zweigeteilten Wach-Schlaf-Rhythmus. Man spricht dann von einem «polyphasischen» Schlaf, bei dem sich die Schlaf- und Wachphasen unabhängig von der Tages- und Nachtzeit abwechseln, mitunter bis zur kompletten Tag-Nacht-Umkehr. Folgende Massnahmen können helfen, solche Schlafstörungen zu überwinden:

- Eine klare, einfache und gleichbleibende Tagesstruktur hilft Menschen mit Demenz, zeitlich besser orientiert zu bleiben. Dies wirkt sich auch positiv auf den Schlaf-Wach-Rhythmus aus.
- Wichtig ist, dass Menschen mit Demenz am Tag genug Licht bekommen, damit das körpereigene Hormon Melatonin den Schlaf regulieren kann.
- Das Zubettgehen lässt sich vorbereiten, indem man die Raumbelichtung beim Einnachten reduziert.
- Zu viel Tagesschlaf, wie etwa langes Ausschlafen und längeres Dösen, sollte vermieden werden. Auch sollte die betroffene Person möglichst selten im Bett verbleiben bei Aktivitäten wie Fernsehen, Essen usw.

- Geht die betroffene Person nachts längere Zeit in der Wohnung umher, ist sie womöglich desorientiert. Eine Beleuchtung mit Bewegungsmeldern hilft, den Weg zur Toilette immer ausgeleuchtet zu halten. Leuchtstecker in den Steckdosen markieren den Weg [zu weiteren Anpassungen siehe auch das Infoblatt: «Die Wohnung anpassen»].
- Die Desorientierung in der Nacht kann dazu führen, dass die betroffene Person in Aufregung gerät, sich allein fühlt und glaubt, alles Mögliche erledigen zu müssen. Gehen Sie auf ihre Besorgnis ein, bieten Sie ihr Rückhalt und Orientierung. Eine warme Milch mit Honig oder ein Kräutertee kann helfen, sie wieder zum Schlafengehen zu bewegen.
- Beseitigen Sie möglichst alle Gefahrenquellen in der Wohnung und schliessen Sie zur Sicherheit die Wohnungs- und Balkontüre ab. Möglicherweise sind ein paar kleinere Anpassungen in der Wohnung nötig. Informieren Sie sich dazu im Infoblatt «Die Wohnung anpassen».

### Weitere Ursachen für Schlafstörungen

Neben den demenzspezifischen Beeinträchtigungen können weitere körperliche und psychische Probleme zu einer Verschlechterung des Schlafes führen. Weil sich Menschen mit Demenz in vielen Fällen nicht mehr wie gewohnt mitteilen können, braucht es etwas Spürsinn und auch Geduld, um herauszufinden, wo die Ursache für eine Schlafstörung liegen könnte. Machen Sie sich Notizen, wann und in welchen Situationen die Schlafstörungen besonders oft auftreten. Eine ärztliche Abklärung und Untersuchung hilft, Klarheit über die Ursachen zu erlangen und eine geeignete Therapie zu finden.

- Möglicherweise leidet die betroffene Person an einer Depression. Depressionen kommen bei Demenz häufig vor und beeinträchtigen unter anderem den Schlafrhythmus. Mit einer medikamentösen Behandlung [Antidepressiva] kann sich die Situation verbessern.
- Vielleicht erlebt die betroffene Person nachts Halluzinationen, die mitunter starke Angst ver-

ursachen können. Falls nötig kann der Hausarzt eine spezifische medikamentöse Behandlung verschreiben.

- Ist die betroffene Person unruhig, weil sie Schmerzen hat? Fragen Sie nach und achten Sie auch auf ihr Verhalten. Vielleicht kann sie ihre Beschwerden nicht von sich aus mitteilen.
- Erkrankungen von Herz und Lunge sowie Infektionen, Probleme mit der Verdauung oder dem Wasserlassen verursachen oder verstärken Schlafstörungen.
- Alkohol, Nikotin, Kaffee, Tee und Medikamente, aber auch Dosisänderungen oder das plötzliche Absetzen von Medikamenten können Schlafstörungen verursachen.

### Schlafmittel

Schlafmittel sind keine ideale Lösung, schon allein deshalb nicht, weil Betagte und Menschen mit Demenz spezifische unerwünschte Nebenwirkungen haben können. Sie sollten deshalb nie eigenmächtig verabreicht werden, sondern nur nach Absprache mit dem Arzt und erst wenn der Einsatz nichtmedikamentöser Massnahmen erfolglos geblieben ist. Erst dann können sie sich, gezielt eingesetzt, als nützlich erweisen. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang Folgendes:

- Gewisse Schlafmittel wirken, insbesondere bei älteren Menschen, am nächsten Tag nach und verursachen Benommenheit oder Schläfrigkeit. Tages-schläfrigkeit kann Schlafstörungen verstärken und erhöht zudem die Sturzgefahr.
- Beruhigungsmittel [Benzodiazepine], die manchmal zum Einschlafen verabreicht werden, sollten nur sehr zurückhaltend eingesetzt werden, da sie sich oft negativ auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken.
- Informieren Sie den Arzt, wenn das Schlafmittel nicht hilft oder Sie störende Nebenwirkungen feststellen – er kann die Dosis anpassen oder das Präparat wechseln.

- Der Einsatz von Schlafmitteln sollte nach ein paar Wochen neu beurteilt werden.
- Schlafstörungen bei Menschen mit Demenz sind oft komplex und schwierig zu behandeln. Eine Beratung in einer gerontopsychiatrischen Spezialsprechstunde kann weiterhelfen.
- Zur Krisenbewältigung sowie zur Abklärung und Behandlung von Schlafstörungen mag ein kurzer Aufenthalt in der Gerontopsychiatrie sinnvoll sein.

### Den eigenen Schlaf schützen

Auch der Schlaf von pflegenden Angehörigen wird bei Schlafproblemen von Menschen mit Demenz in Mitleidenschaft gezogen. Daher ist es wichtig, dass für beide Seiten eine Besserung angestrebt wird. Dies ist leichter gesagt als getan, doch sind folgende Massnahmen einen Versuch wert:

- Der Besuch einer Tagesklinik oder eine Spazierbegleitung stimuliert die Person mit Demenz tagsüber zusätzlich. Womöglich ist sie danach am Abend müder und entspannter als sonst.
- Durch das Beheben möglicher Gefahrenquellen haben Sie die Gewissheit, dass der/die Kranke nachts in der Wohnung weder sich selbst noch andere gefährdet. So können Sie sich selbst besser entspannen.
- Getrennte Betten bzw. Zimmer erlauben mehr Ruhe.
- Überlassen Sie die Hilfe beim Zubettgehen an bestimmten Abenden der Spitem.
- Bei schweren Schlafstörungen kann eine Nacht- klinik oder ein Kurzaufenthalt in einem Pflegeheim die pflegenden Angehörigen entlasten.

Anhaltende Schlafstörungen stehen bei den Ursachen für den Eintritt einer demenzkranken Person in ein Pflegeheim oft im Vordergrund.

Benötigen Sie eine persönliche, auf Ihre individuelle Situation zugeschnittene Beratung?

Die Fachberaterinnen am Alzheimer-Telefon beantworten alle Ihre Fragen rund um das Thema Demenz.

**Alzheimer-Telefon: 058 058 80 00**  
Montag bis Freitag: 8–12 und 13.30–17 Uhr

Die 21 kantonalen Sektionen von Alzheimer Schweiz sind auch in Ihrer Region für Sie da. Kontaktieren Sie uns via [alz.ch](http://alz.ch).

#### Impressum

Redaktion und Herausgeberin:  
Alzheimer Schweiz

Wissenschaftlicher Beirat:  
Alice Köppli, ehemalige Leiterin Tages-/Nacht- klinik  
Dr. med. Daniel Inglin, Geriatrie